

Rapport fra befarings på Flade Rivingen 19. Juni 2024

Av Per Arvid Åsen

Det åpne bruddet mot vest fremstår med relativ sparsom vegetasjon (foto PER_6859 mot sør). I sørenden (og nordenden) stort kratt med rynkeroser og et 10-talls små morelltrær (PER_6872) (for vitenskapelig navn, se artslista). Lenger mot øst liten bestand blankstorkenebb. Sparsom strandbergvegetasjon med stemorsblom, smørbukk og sandarve. Litt lenger sør, grisnestarr, strandkryp og en bestand stornesle. Hestehavre vanlig. Helt nede i "gropa" i bruddet strandkryp, noe salturt og tangmelde, de siste beitet av gjess. I bruddet mot nord, rynkeroser, og relativ sparsom vegetasjon med arter som strandbalderbrå, smalkjempe, einer, fuglevikke (og svært små vill-lin). Triviell vegetasjon, med strandrug i spredte tuer, videre strandkryp og tangmelde. Bergvegg bl.a. stankstorkenebb, gjeldekarve. Småvokste vill-løk spredt i området.

Straks vi nærmer oss utkanten av det åpne steinbruddet blir vegetasjonen mer frodig med flere arter, hvorav vill-løk i tette bestander sammen med blant annet rundskolm (foto PER_6837), vendelrot og bitterbergknapp (PER_6845).

Oppe på flate holmen frodig vegetasjon (blant annet som følge av nok fuktighet i mai-juni), dominert av guldfarget bitterbergknapp, sammen med rundskolm, vendelrot og stedvis fine prestekragebestander (PER_6830). Rosebusker spredt, foreløpig bestemt til steinnype. Fine og tette bestander av vill-løk. Svært tette bestander av smalkjempe markerer seg flere steder (PER_6846). Stemorsblom og rundskolm ofte i tette bestander. Store tuer blodstorkenebb i sørlige del (PER_6815).

Hele holmen fremstår med svært frodig og rik strandbergvegetasjon hvor hovedsakelig rundskolm, bitterbergknapp, vill-løk, smalkjempe, stemorsblom, vendelrot, prestekrager og smørbukk danner en fargerik og iøynefallende mosaikk (PER_6820).

Et enslig asketre i den sørlige dele av holmen var den eneste rødlistede arten som ble funnet. Rynkeroser og sprikemispel er oppført på fremmedartslisten med svært høy risiko på fremmedartslisten.

Min konklusjon blir den samme som i tidligere rapportert av Lie m.fl. i 2022. Største delen av Flade Rivingen inngår i naturtypen "rikt strandberg" og det er naturlig å dele opp naturtypen i to, "rikt strandberg" som omfatter mesteparten av holmen og selve steinbruddet som "skrotemark".

Artslisten teller 55 arter, alle er registrert på artskart og det er tatt herbariebelegg av 22 arter til herbarium KMN ved Naturmuseum og botaniske hage, UiA.

(Den sørlige del av holmen var tydeligvis den del av holmen som fuglene brukte, med hissige måker og i alle fall en terne. Svartbak, tjeld og fiskemåker, samt fiskand/siland utenfor iflg båtfører Øyvind Simonsen. Ingen fugl på nordlige del av holmen. Gåseeksremitter over hele holmen.)



PER_6859



PER_6872



PER_6837



PER_6845



PER_6830



PER_6846



PER_6815



PER_6820